



ANALYSE DU CONCEPT DE « SUICIDALITÉ » : les impacts pour la pratique infirmière

Nathalie Maltais
Étudiante
Ph. D. inf.
Caroline Larue
Ph. D. inf.
Professeure
Christine Genest
Ph. D. inf.
Professeure
Collaboration:
Marie Alderson
Ph. D. inf.
Professeure

RÉFÉRENCES POUR L'AFFICHE
 D'ANALYSE DE CONCEPT

Abadie, P. (2012). Conduites suicidaires chez les adolescents et les jeunes adultes avec un trouble envahissant du développement. *Spécialité mentale au Québec*, 37(2), 175-192.

Kraus, A. et al. (2014). Coping, suicidalité et trouble de la personnalité limite à l'adolescence. *Neuropsychiatrie - Enfance Adolescence*, 1-8.

Meyer, R. E., Salzman, C., Youngstrom, E. A., Clayton, P. J., Quisenberry, F. K., Mann, J. J., Sheehan, D. V. (2010). Suicidality and risk of suicide-definition, drug safety concerns, and a necessary target for drug development: a consensus statement. *J Clin Psychiatry*, 71(8).

Laferrière, F., Thibault, C., Durand, B., & Ordre des infirmières et infirmiers du Québec. (2007). *Prévenir le suicide pour préserver la vie - guide de pratique clinique*. Westmount, Québec: Ordre des infirmières et infirmiers du Québec.

Pransky, K., Malin, G. A., Stanley, B., Oquendo, M. A., & Gould, M. (2007). Factors in the assessment of suicidality in youth. *CNS Spectr*, 12(2), 156-162.

Walker, L. O., & Assent, K. C. (2011). *Strategies for theory construction in nursing* (2th ed.). Boston: Plurixco Hall.

PROBLÉMATIQUE

« Suicidalité » est un terme :

- Générique
- Imprécis (Abadie, 2012)

Il comprend :

- Les pensées suicidaires
- Les idéations suicidaires
- Les tentatives de suicide
- Le suicide accompli (Abadie, 2012)

Résultats :

- Diverses réalités cliniques pouvant entraîner de la confusion tant au niveau clinique (dépistage) que de la recherche (prévalence)

(Meyer et al. 2010)

En soins infirmiers, la prévention du suicide consiste en :

- Une activité professionnelle importante (OIIQ, 2007). Il importe de définir explicitement en quoi consiste l'évaluation de la « Suicidalité », et ce, plus particulièrement chez les enfants

BUT DE L'ANALYSE DE CONCEPT

Clarifier le concept de « Suicidalité » afin d'en permettre une meilleure compréhension et utilisation en soins infirmiers pédopsychiatriques.

MOTEURS DE RECHERCHE UTILISÉS

Mots clés : « Suicidalité », *Suicidality*, enfant / child, adolescent / adolescent

Medline : 10 articles

PsyInfo : 10 articles

CINAHL : 8 articles + une lettre réponse éditoriale

Critères d'inclusion :

« Suicidalité » dans le titre, articles en français et en anglais publiés de 2009 à 2014

MODÈLE DE WALKER ET AVANT (2005)

- Choisir un concept
- Déterminer la cible ou les buts de l'analyse
- Identifier les usages du concept
- Déterminer les attributs du concept
- Identifier un cas modèle, un cas limite, un cas relié, un cas inventé ou un cas illégitime
- Identifier les antécédents et les conséquences
- Identifier les référents empiriques

ANTÉCÉDENTS

- Tentatives antérieures et létalité
- Problèmes de sommeil
- Troubles psychiatriques (D, TDAH, TC)
- Prise de certains médicaments
- Enfance avec abus et/ou négligence

ATTRIBUTS

Idéations suicidaires :

- Caractérisées par le désir de mourir et par des pensées spécifiques à propos de l'acte de se tuer ou de commettre le suicide

Comportements suicidaires :

- Les tentatives de suicide et les tentatives de suicide interrompues incluant les actes préparatoires : (rassembler du matériel, visiter un site potentiel, donner ses avoirs, écrire une lettre de suicide)

(POSNER ET AL. 2007)

CONSÉQUENCES

- Blessures
- Hospitalisation
- Traitement
- Thérapie
- Mort

IMPACTS SUR LA CLARIFICATION DU CONCEPT DE « SUICIDALITÉ »

- Évaluation
- Dépistage
- Intervention
- Éventuellement sur la prévention du suicide en général

Selon Meyer et al. (2010) :

- Une meilleure cohérence terminologique avec des définitions standardisées pourrait améliorer la qualité, la surveillance, le traitement, la prévention du suicide ainsi que la recherche